

Reptileshop Repticura

Ouddeelstraat 6a-23
8936 AX Leeuwarden
tel. 06-52563154 / 058-2804506
postadres: Utein 28
9244 AB Beetsterzwaag
KvK: 55730205
BTW nr: NL 089166486B01
www.repticura.nl
email: info@repticura.nl



Acanthodactylus erythrurus

Nederlandse naam: Roodstaartfranjeteen-hagedis
Duitse naam: Gewöhnlicher Fransenfinger
Engelse naam: European Fringefinger

Plaats in het dierenrijk:

Klasse: Reptilia
Onderklasse: Lepidosauria
Orde: Squamata (hagedissen / slangen)
Suborde: Sauria (hagedissen)
Infraorde: Scincomorpha (skinkachtigen)
Familie: Lacertidae (echte hagedissen)

Lengte: Tot 20 cm.

Herkomst: De roodstaartfranjeteen-hagedis komt voor in op de zandige en rot-sige streken van Noord-Afrika / Iberisch schiereiland en Zuid-Frankrijk
Terrariumtype: Deze dieren vragen een rotterrarium. Naast veel grondoppervlak (zand) moeten ze ook klimgelegenheid hebben in de vorm van stenen en stronken. Daarbij moet er goed op worden gelet dat deze goed vast liggen en niet kunnen kantelen of vallen! De klimmogelijkheden moeten ook een zonplaats kunnen bieden. In het algemeen moet het terrarium droog worden gehouden.

Temperatuur: 25 - 35 °C. (dagtemperatuur)
15 - 20 °C. (nachttemperatuur)

Voedsel: Een koele winterperiode (8 - 10 °C) van 4 tot 8 weken is sterk aan te raden. Grotere insecten. Volwassen sprinkhanen, krekels, moriowormen, vlin ders e.d. kunnen als levend voer worden aangeboden. Wormen kunnen als aanvulling worden gegeven. Voer deze altijd in een bakje waar ze niet uit kunnen ontsnappen. De voedseldieren voor het voeren be strooien met calciumpoeder. Eén keer per week vitaminepreparaat toe dienen (zie ook 'water').

Water: De dieren vragen een grote waterbak. Dagelijks moet het water worden ververs. Gebruik altijd lauw water. Eén keer per week kan aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

Voortplanting: De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 2 - 6 stuks.

Het vrouwtje houdt de steenrode onderkant van de staart.

Overige opmerkingen: geen