

Reptileshop Repticura

Ouddeelstraat 6a-23
8936 AX Leeuwarden
tel. 06-52563154 / 058-2804506
postadres: Utein 28
9244 AB Beetsterzwaag
KvK: 55730205
BTW nr: NL 089166486B01
www.repticura.nl
email: info@repticura.nl



Anolis sagrei

Nederlandse naam: Sagra's anolis
Duitse naam: Bahamaanolis
Engelse naam: Brown anole

Plaats in het dierenrijk:

Klasse: Reptilia
Onderklasse: Lepidosauria
Orde: Squamata (hagedissen / slangen)
Suborde: Sauria (hagedissen)
Infraorde: Iguania (leguaanachtigen)
Familie: Iguanidae (leguanen)
Onderfamilie: Anolinae (anolissen)

Lengte: Tot 20 cm.

Herkomst: De Sagra's anolis komt voor in Florida tot aan Centraal-Amerika, ook komen ze voor op veel Caribische eilanden.

Terrariumtype: De Sagra's anolissen vragen een rijk beplant terrarium met een zeer hoge luchtvochtigheid. De bodem moet licht vochtig zijn. Als materiaal kunnen bark, hydro-korrels of spagnum worden gebruikt. Enkele rotsen op de grond zijn nodig voor dit dier. Het brengt normaal gesproken veel tijd op de grond door.

Temperatuur: 25 - 30 °C. (dagtemperatuur)
15 - 20 °C. (nachttemperatuur)

Voedsel: Kleinere insecten. Krekels, vliegen, weideplankton, kleine treksprinkhanen, buffalo- en meelwormen kunnen worden gevoerd. Bij meelwormen oppassen met oudere exemplaren vanwege het te harde chitineschild. Wormen in het algemeen niet gebruiken als hoofdvoedsel en altijd voeren in een bakje waar ze niet uit kunnen ontsnappen. De voedseldieren voor het voeren bestrooien met calciumpoeder. Eén keer per week vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water').

Water: De dieren vragen een waterbak. Dagelijks moet het water worden ververst. Dagelijks moet er worden gesproeid. Gebruik altijd lauw water. Eén keer per week kan aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd. Handhaaf een redelijk hoge vochtigheidsgraad.

Voortplanting: De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 2 stuks.

Het mannetje heeft een grotere keelzak.

Overige opmerkingen: