

Reptileshop Repticura

Ouddeelstraat 6a-23
8936 AX Leeuwarden
tel. 06-52563154 / 058-2804506
postadres: Utein 28
9244 AB Beetsterzwaag
KvK: 55730205
BTW nr: NL 089166486B01
www.repticura.nl
email: info@repticura.nl



Anolis carolinensis

Latijnse naam: *Anolis carolinensis*

Nederlandse naam: Roodkeel-anolis

Duitse naam: Rotkehl-Anolis

Engelse naam: Carolina anolis

Uiterlijk

Anolissen zijn kleine hagedissen die binnen de dierenhandel veel worden aangeboden. Ze zijn sterk, hebben interessant gedrag en ook nog eens goed te kweken. Een zeer aanbevelenswaardige soort dus, ook voor beginners met het houden van hagedissen. Er zijn veel verschillende soorten anolissen maar de meest vertegenwoordigt in terraria zijn de Anolis Carolinensis en de Anolis Sagrei. De Carolinensis is de meest bekende van de twee. De kleur is meestal groen, maar onder invloed van omgeving, gemoedstoestand etc. kan de kleur ook bruin zijn. Het mannetje heeft een felgekleurde keelzak waarmee hij vrouwtjes probeert te imponeren en zijn territorium af te bakenen. Hij doet dit d.m.v. kopknikken. Tijdens dit ritueel zal de keelzak steeds uit worden gezet en dit is zodoende een krachtig, beweging en kleur, signaal. De Anolis Sagrei heeft hetzelfde gedrag als de Carolinensis. De Sageri heeft een fijne nettekening in tinten bruin. De keelzak is knalrood en duidelijk intenser van kleur dan bij de Carolinensis.

Verspreidingsgebied

Anolissen komen van nature uitsluitend in de nieuwe wereld voor. het verspreidingsgebied op het vasteland reikt van Brazilië tot aan de zuidelijke staten van de USA. Ook op de eilanden in het Caribisch gebied, de Bahama's en op enkele eilandjes in de Pacifische oceaan zijn ze vertegenwoordigd. Door toedoen van de mens zijn verschillende soorten her en der met succes ingevoerd. Veel soorten Caribische anolissen hebben tegenwoordig stabiele populaties in Florida en in het Guyana-bekken.

Huisvesting

Een terrarium met veel klimgelegenheid, dus een hoog terrarium, is heel geschikt voor anolissen. Plaats veel klimtakken van verschillende dikte. De achterwand kan bestaan uit kurkplaat. Deze kun je laten begroeien met planten zodat er veel schuilplaatsen ontstaan. De bodem bedek ik zelf met turf of orchideeën aarde. In deze aarde plaats ik de planten. Een waterbak en een warmtelamp maken het geheel compleet. Ik besproei mijn bak om de dag voor een redelijk vochtig klimaat. Dit is o.a. noodzakelijk voor een goede vervelling van de dieren. De dagtemperatuur moet tussen de 22 graden en de 30 graden liggen. Op de plek waar de dieren zonnen mag de temperatuur wat oplopen. Om de Carolinensis te kweken is een rustperiode nodig waarbij de temperatuur mag dalen tot 15 - 20 graden.

Anolissen willen een terrarium dat vooral in de hoogte voldoende ruimte biedt. Ze komen nauwelijks op de bodem en willen dus veel klimgelegenheid. Dat kan in de vorm van takken en een achterwand met schors. Zorg ook voor een ruime beplanting omdat ze altijd op bladeren zitten die ze niet beschadigen door hun geringe gewicht. Geschikte planten zijn: Bromelia's, Varens, Monstera, Philodendron. Besproei deze regelmatig met water dat zo als drinkwater dient voor de dieren en zodat de vochtigheidsgraad rond de 70% blijft.

Sommige soorten klimmen tegen glas op. Minimaal een terrarium van 50x25x50 cm lxbxh voor een diertje. De vereiste dag temperatuur is voor deze soort 24 - 27° en mag 's nachts dalen tot 18 - 20 °. Men moet zich informeren over het heersende klimaat in het gebied van herkomst.

Inrichting

Voor twee tot vier dieren is minimaal een terrarium van 40x30x40 cm nodig. In de natuur komen deze dieren voornamelijk voor in licht vochtige gebieden (bossen). Het terrarium dient overeenkomstig de biotoop ingericht te worden met flink wat takken en een bodembedekking die het vocht langere tijd vasthoudt. Ideaal hiervoor zijn schors snippers (Repti Bark). Verdere aankleding van het terrarium kan bestaan uit diverse plastic planten. Uiteraard mag een drinkbakje niet ontbreken (Repti Rock Waterdish). Het water dient minimaal driemaal per week ververs te worden. Om de luchtvochtigheid in het terrarium op peil te houden kunt u het beste om de dag even licht sproeien met Bio Mist. Voor de verlichting en verwarming komt een Repti Basking Spot Lamp in aanmerking. Het wattage van de lamp is afhankelijk van de grootte van het terrarium. Als aanvulling is het aan te bevelen een TL te gebruiken die ultraviolet licht uitstraalt als vervanging van het zonlicht in de natuur (Repti Glo 5.0). Uit ervaring is gebleken dat bij het gebruik van dit licht de kleuren van de dieren beter tot uiting komen en zowel het eet- als paargedrag gestimuleerd wordt. Beide lichtbronnen mogen 12 tot 14 uur per dag branden. Eventuele bijverwarming, voor de nacht of tijdens de winter, kan in de vorm van een porseleinen warmtestraler (Ceramic Heat Emitter), een rode spotlamp (Infrared Heat Lamp), een warmtesteen (Repticare Rock Heater) of warmtemat (Vivarium Heat Mat).

Voedsel

Beide soorten eten het standaard terrariumvoedsel zoals: krekels, vliegen, wasmotten fruitvliegen. Ook spinnen worden graag gegeten (geen kruisspinnen). Het voedsel 1 keer per week bepoedern met vitaminen en kalk. Dit laatste is vooral van belang voor zwangere vrouwtjes. Twee tot drie keer per week dienen de dieren gevoerd te worden met krekels en/of krulvliegen. Als richtlijn kunnen per keer per dier 10 krekels gegeven worden. Door een bakje met buffalowormen in het terrarium te plaatsen hebben de dieren ook tussen de voederbeurten wat te eten. Het is raadzaam om een bakje met Cricket Formula op de bodem van het terrarium te plaatsen zodat eventueel niet direct opgegeten krekels iets te eten hebben en niet 's-nachts aan de hagedissen gaan knagen. Vitamines:

Aangezien vitamines en kalk essentieel zijn voor de gezondheid van uw dieren is het noodzakelijk om bij iedere voederbeurt de insecten te bepoedern met een vitamine- en calciumpreparaat (**Repti Vit**). Het makkelijkst gaat dit door de krekels vanuit het verpakkingsdoosje over te zetten in een plastic zakje en daar dan het poeder aan toe te voegen. Vervolgens even schudden zodat het poeder aan de insecten kan hechten en dan het zakje leeg strooien in het terrarium. Wanneer niet voldoende kalk en vitamine D3 toegediend of opgenomen wordt kunnen er diverse gebreken op gaan treden zoals verweking van de botten.

Vitamine in de vorm van een AD3-vloeistof kan aan het drinkwater worden toegevoegd.

Voortplanting

De mannetjes zijn behoorlijk agressief. Dit is vooral gericht tegen andere mannetjes, maar ook vrouwtjes moeten het ontgelden. Een mannetje dat parlustig is kan eindeloos achter een vrouwtje aanjagen. Anolissen kun je dan ook nooit in een groep houden. De zwakkere dieren zullen dan steeds worden verjaagd en nauwelijks rust hebben. Uiteindelijk zal het zwakkere dier sterven van stress en ondervoeding. Het beste is een paartje aan te schaffen. Als er voldoende schuilmogelijkheden zijn dan gaat dat in de meeste gevallen goed. Als een vrouwtje bereid is tot paren dan zal zij niet meer wegvlugten van het mannetje. De paring is in onze ogen een zeer brute aangelegenheid. Het mannetje, dat veel groter is, bijt zich vast in het nekvel van het vrouwtje. Hij houdt haar zo vast tot de paring heeft plaatsgevonden. In de nek van het vrouwtje blijven duidelijke sporen in de nek van de paring achter. Als het vrouwtje eieren bij zich draagt dan is dat duidelijk te zien aan haar omvang. Als ze plotseling weer dunner is dan weet je dat de eieren gelegd zijn. De eieren kun je dan uit laten komen in een broedstoof. De eieren moeten in de zelfde stand in de broedstoof liggen als ze in het terrarium gevonden zijn. Anders komen ze niet uit. Een broedstoof is een klein aquarium dat je voor de helft vult met water. Op het water leg je een plaat piepschuim dat exact past tegen de wanden van het terrarium. In het water doe je een verwarmingselement die de temperatuur op 30 graden moet houden. Op de piepschuim plaat zet je een open bakje met daarin vochtige aarde of speciaal daarvoor verkrijgbaar materiaal. De aarde vochtig houden en het geheel afdekken. Mannen zijn verhoudingsgewijs groter en hebben een duidelijk grotere keelkam.

Kleurvormen

De roodkeelanolis (*Anolis carolinensis*) een soort die van groen naar bruin kan verkleuren en waarvan de mannetjes een roze keelzak hebben. Deze soort heeft een winterrust nodig. De bruine anolis (*Anolis sagrei*) is bruin met een vlinderteken en de mannen hebben een rode keelzak met een gele rand.

Ziektes

Uiteraard kan uw nieuwe huisdier ook ziek worden, net als ieder ander dier. Alle mogelijke ziektes in deze brief schrijven is onmogelijk.

Als u twijfels heeft over de gezondheid van uw dier, neemt u dan contact met ons op, misschien kunnen wij u helpen, zoniet dan verwijzen wij u door naar een dierenarts die gespecialiseerd is in het behandelen van reptielen en amfibieën.

Aanwijzingen voor mogelijke ziekten kunnen zijn:

Lusteloos gedrag, slechte eetlust en weinig bewegen (bij een normaliter actief dier) Moeilijk ademen, met de bek open ademen, dit kan wijzen op luchtweginfecties. Afwijkende ontlasting, diarree, abnormaal ruikende ontlasting, of helemaal geen ontlasting. Deze symptomen kunnen wijzen op een besmetting met darmparasieten of een bacteriële ontsteking

Braken of regurgiteren (opgeven) van voedsel

Kleine rode of zwarte spinachtige beestjes die over uw dier lopen. Dit zijn mijten, deze diertjes voeden zich met het bloed van uw huisdier en moeten zo snel mogelijk bestreden worden.

(Let op! Ziektes kunnen zich ook op andere manieren uiten, als uw huisdier ander gedrag vertoont dan wat hierboven beschreven is, laat het ons even weten, wij kunnen u misschien verder helpen en u eventueel doorverwijzen naar een dierenarts.)